

VACCINO DA UTILIZZARE: MONODOSE PRECARICATO
MULTIDOSE

ALLEGATO 2 FOGLIO INFORMATIVO RIASSUNTIVO

QUESTO FOGLIO DEVE ESSERE CONSERVATO

Vaccino contro l'influenza pandemica (H1N1)

Il vaccino che Le è stato somministrato è stato autorizzato dalla Commissione Europea dopo parere favorevole dell'Agenzia Europea dei Medicinali e secondo le raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Questo vaccino è autorizzato per la sua somministrazione a partire dai 6 mesi di età.

Cosa contiene il vaccino

Il vaccino non contiene il virus intero ed attivo dell'influenza; sono presenti:

- alcune proteine esterne del virus capaci di stimolare le nostre difese contro l'influenza
- un'emulsione olio/acqua che aumenta la risposta protettiva
- un conservante a base di thiomersal (sale organico metallico)
- tracce di proteine dell'uovo, antibiotici e sterilizzanti utilizzati nella preparazione.

Nessuno dei componenti del vaccino può provocare l'influenza.

Il tipo e la quantità delle sostanze contenute nel vaccino si sono dimostrate sicure.

Gravidanza e allattamento. Uso di farmaci

La vaccinazione contro l'influenza è raccomandata per le donne al secondo trimestre e terzo trimestre di gravidanza. Il vaccino può essere usato durante l'allattamento.

Le medicine in uso devono continuare ad essere assunte

Controindicazioni alla somministrazione del vaccino

- ◆ se si è avuta una reazione allergica con pericolo di vita a sostanze contenute anche nel vaccino
- ◆ in presenza di malattia acuta moderata o grave; febbre alta (oltre 38 °C).

Effetti indesiderati

Gli effetti indesiderati sono simili a quelli che compaiono con i vaccini influenzali stagionali.

Sono Comuni:

Arrossamento, gonfiore o dolore nel sito di iniezione, febbre, stato di indisposizione generale, stanchezza, mal di testa, aumento della sudorazione, brividi, dolore a livello di muscoli e articolazioni.

Nei bambini piccoli sono stati rilevati anche irritabilità, pianti insoliti, sonnolenza, diarrea e cambiamenti nelle abitudini alimentari.

Questi effetti indesiderati scompaiono generalmente entro 1-2 giorni senza trattamento.

Dopo la vaccinazione possono verificarsi molto raramente reazioni allergiche immediate,

Se nei prossimi giorni dovesse avere bisogno di cure per la comparsa di qualche disturbo, informi il medico che la visita che ha eseguito questa vaccinazione ed avvisi il centro vaccinatore.

Una seconda dose di vaccino verrà somministrata, se necessaria, dopo un intervallo di almeno 3 settimane.

DOPO LA VACCINAZIONE ATTENDA ANCORA 30 MINUTI PRIMA DI LASCIARE QUESTO CENTRO

Cognome _____ Nome _____

Luogo nascita _____ Data nascita _____

Vaccinazione I^a dose eseguita il _____

Timbro

Seconda dose necessaria? (barrare casella): **SI **NO****

NB: Per i nati dal 2000 al 2009 è prevista la somministrazione di seconda dose. La seconda dose si somministra ad almeno 21 giorni di distanza dalla prima dose.

Per l'esecuzione della seconda dose è necessario chiedere appuntamento all'ambulatorio vaccinazioni (SISP – Servizio Igiene Pubblica) presso il Distretto Sanitario di residenza.

Per ulteriori informazione telefonare al SISP 0444 / 475680 da lunedì al venerdì – ore 09,00 – 12,00.

II^a dose eseguita il _____

Timbro